Instructions for Use (EN)

Cutimed® Siltec®

Silicone foam dressing with superabsorbers

Product description

Cutimed® Siltec® dressings are an assortment of silicone coated foam dressings.
Cutimed® Siltec® is a sterile, single-use absorbent polyurethane foam dressing for atraumatic dressing changes that contains superabsorbent stripes which absorb and lock wound exudate.
The wound contact surface is a perforated silicone layer that allows adherence to the peripheral skin but not to the moist wound bed or to newly formed epithelial tissue. This minimizes trauma and pain during dressing changes. The outer film is opaque, resistant, yet permeable to oxygen and vapor.
The foam dressing and the superabsorbent stripes are designed to absorb and to lock away excess wound fluid inside the dressing, promoting a moist wound environment and minimizing the risk of maceration. Cutimed® Siltec® is highly conformable and provides protection of the wound site. Cutimed® Siltec® leaves no residues in the wound. The dressing reliably retains wound exudate, even under compression. If necessary the dressing can be cut to size.

Intended purpose

Cutimed® Siltec® is intended for the treatment of exuding wounds with low to high exudate levels such as venous and arterial ulcers, pressure ulcers, diabetic foot ulcers, surgical incisions, skin grafts and donor sites, lacerations or abrasions.
Cutimed® Siltec® may assist in the prevention of pressure ulcer as part of a comprehensive plan of continuous care, risk assessment and preventive care by a healthcare facility and healthcare professional.

Please contact your healthcare professional if you are unsure whether the product is appropriate for you.

Contraindications

There are no known contraindications.

Warnings and precautions

Cutimed® Siltec® is packaged for single-use. Do not re-use or re-sterilise as there is a risk of transmission of body fluids or contaminated tissue between patients. Do not use if the pouch is already open or damaged as the sterility of the device is guaranteed only when the pouch is unopened and undamaged prior to use. Discard open or unused material. Do not use with oxidizing solutions such as hypochlorite or hydrogen peroxide. Remove the dressing prior radiation therapy. For external use only.
The wound should be inspected for signs of infection and treated according to clinical practice if required. In rare cases skin reactions (e.g. redness, itching) may occur.
If the treated condition deteriorates, fails to improve or if a side effect is observed, consult a physician or an appropriate healthcare professional.

Directions for use

1. Clean the wound and your hands according to good clinical practice. If you are unsure how to clean the wound (cleansing), please contact your healthcare professional for further instructions.
2. Make sure the surrounding skin is dry.
3. Choose an appropriate dressing size that covers the wound and overlaps the wound edges (A).
4. Please ensure, that the pouch is not open or damaged. Open the pouch and take out the dressing.
5. Remove protective film (B) and apply with the adhesive side towards the wound (C).
6. Avoid stretching the dressing.
7. Apply additional dressing fixation.
8. Cutimed® Siltec® may be used on an infected wound in addition to antimicrobial therapy under medical supervision.
9. If necessary, Cutimed® Siltec® can be used in combination with other dressings e.g. Cutimed® Sorbact®/Sorbact® (in case of infected wounds) or hydrogel e.g. Cutimed® Gel (for dry, necrotic wounds).
10. Cutimed® Siltec® can remain in place for up to 7 days, depending on wound conditions and saturation of wound dressing. It is recommended to change the dressing every 24 hours initially, moving to less frequent changes as necessary.
11. Carefully remove any additional dressing fixation and gently remove Cutimed® Siltec® from the wound and discard.
12. If required, cleanse the wound prior to application of a new dressing.

Storage and Disposal

Store dressing away from direct sunlight at ambient temperature and humidity. Keep out of the reach of children.
Discard used product according to local regulations, e.g. via regular household or clinical waste.

Notice

Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to BSN medical GmbH and the competent authority of your state.

Notice d'emploi (FR)

Cutimed® Siltec®

Pansement hydrocellulaire haute performance siliconé

Description du produit

Les pansements Cutimed® Siltec® sont un assortiment de pansements revêtus de silicone.
Cutimed® Siltec® est un pansement hydrocellulaire stérile absorbant en mousse de polyuréthane conçu pour des changements de pansement atraumatiques, contenant des bandes superabsorbantes qui absorbent et retiennent l'exsudat de la plaie.
La surface de contact pour la plaie est une couche perforée de silicone assurant une adhérence à la peau périphérique sans adhérer au lit de la plaie humide ou au tissu épithélial nouvellement formé. Cela permet de limiter les traumatismes et la douleur lors des changements de pansements. Le film extérieur opaque, résistant à l'eau mais perméable à l'oxygène et à la vapeur d'eau.
Le pansement en mousse et les bandes super-absorbantes sont conçus pour absorber les fluides excédentaires de la plaie et les retenir dans le pansement, créant ainsi un environnement humide favorable à la cicatrisation de la plaie en minimisant le risque de macération. Cutimed® Siltec® est hautement conformable et assure la protection du site de la plaie. Cutimed® Siltec® ne laisse aucun résidu dans la plaie. Le pansement assure une rétention fiable de l'exsudat de la plaie, même sous des bandages de compression. Si nécessaire, le pansement peut être découpé à la taille voulue.

Utilisation prévue

Cutimed® Siltec® est destiné au traitement des plaies exsudatives présentant des niveaux d'exsudats faibles à élevés, comme les ulcères veineux et artériels, les escarres, les ulcères du pied diabétique, les incisions chirurgicales, les greffes cutanées et les sites donneurs de greffes, les lacérations ou les abrasions.
Cutimed® Siltec® peut contribuer à la prévention des ulcères de pression dans le cadre d'un plan complet de soins continus, d'évaluation des risques et de soins préventifs par un établissement de soins de santé et un professionnel de la santé.

Veuillez consulter votre professionnel de santé si vous n'êtes pas sûr que le produit est adapté à votre cas.

Contre-indications

Il n'existe aucune contre-indication connue.

Mises en garde et précautions d'emploi

Cutimed® Siltec® est conditionné pour un usage unique. Ne pas réutiliser ou restériliser afin d'éviter tout risque de transmission de fluides corporels ou de tissus contaminés entre les patients. Ne pas utiliser si l'emballage est déjà ouvert ou s'il est endommagé, car la stérilité du dispositif est garantie uniquement lorsque l'emballage n'est ni ouvert, ni endommagé avant l'utilisation. Jeter tout pansement ouvert et non utilisé. Ne pas utiliser avec des solutions oxydantes comme l'hypochlorite ou le peroxyde d'hydrogène. Retirer le pansement avant administration de rayonnements. Réservé à un usage externe uniquement.
La plaie doit être inspectée pour détecter des signes d'infection et traitée conformément à la pratique clinique, si nécessaire. Dans de rares cas, des réactions cutanées (p. ex. rougeur, démangeaison) peuvent se manifester.
En cas de dégradation ou d'absence d'amélioration de l'état de la lésion traitée, ou en cas d'effet secondaire, consulter un médecin ou un professionnel de santé approprié.

Mode d'emploi

1. Nettoyer la plaie et se nettoyer les mains conformément aux pratiques cliniques recommandées. En cas de doutes quant à la façon de nettoyer la plaie (le lavage approprié), contacter un professionnel de la santé pour obtenir des instructions supplémentaires.
2. S'assurer que la peau qui entoure la plaie est sèche.
3. Choisir une dimension de pansement appropriée, qui couvre la lésion et dépasse des bords de la plaie (A).
4. S'assurer que l'emballage n'est pas ouvert ni endommagé. Ouvrir l'emballage et retirer le pansement.
5. Retirer le film de protection (B) et appliquer le pansement avec le côté adhérent vers la plaie (C).
6. Ne pas étirer le pansement.
7. Appliquer un pansement de fixation supplémentaire.
8. Cutimed® Siltec® peut être utilisé sur une plaie infectée en plus d'un traitement antimicrobien sous surveillance médicale.
9. Si nécessaire, Cutimed® Siltec® peut être utilisé en combinaison avec d'autres pansements tels que Cutimed® Sorbact®/Sorbact® (pour les plaies infectées) ou de l'hydrogel Cutimed® Gel (pour les plaies sèches ou nécrotiques).
10. Cutimed® Siltec® peut rester en place jusqu'à 7 jours, en fonction de l'état de la plaie et de la saturation du pansement. Il est recommandé de changer le pansement toutes les 24 heures au départ, et de procéder à des changements moins fréquents selon les besoins.
11. Retirer avec précaution le pansement de fixation puis retirer délicatement le pansement Cutimed® Siltec® du lit de la plaie. Jeter le pansement usagé.
12. Si nécessaire, nettoyer la plaie avant d'appliquer un nouveau pansement.

Stockage et destruction

Conserver le pansement à l'abri de la lumière directe du soleil, à température et à humidité ambiantes.
Tenir hors de portée des enfants.
Mettre au rebut tout produit utilisé conformément aux réglementations locales, p. ex., déchets ménagers ou cliniques.

Avis

Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit être signalé à BSN medical GmbH, ainsi qu'aux autorités compétentes du pays.

Hinweise zur Anwendung (DE)

Cutimed® Siltec®

Silikon-Schaumverband mit Superabsorbern

Produktbeschreibung

Cutimed® Siltec® ist ein Sortiment von silikonbeschichteten Schaumverbänden.
Cutimed® Siltec® ist ein steriler, einsatzfähiger Polyurethan-Schaumverband zum einmaligen Gebrauch, der für atraumatischen Verbandwechsel sorgt und Superabsorberstreifen enthält, die zusätzlich Wundexsudat absorbieren und binden.
Die Wundkontaktfläche besteht aus einer perforierten Silikonschicht, die an der umgebenden Haut haftet, nicht aber am feuchten Wundbett oder an neu gebildetem Epithelgewebe. Dadurch werden Hautschädigungen und Schmerz während des Verbandwechsels weitestgehend vermieden. Der äußere Abdeckfilm ist wasserabweisend, jedoch sauerstoff- und wasserdampfdurchlässig.
Der Schaumverband und die Superabsorberstreifen absorbieren überschüssige Wundflüssigkeit und schließen sie sicher im Produktinnenraum ein. Hierdurch wird ein physiologisches, feuchtes Wundmilieu unterstützt und gleichzeitig das Risiko von Mazerationen reduziert. Cutimed® Siltec® ist äußerst anschmiegsam und schützt die Wundumgebung. Cutimed® Siltec® hinterlässt keine Rückstände in der Wunde. Der Verband bindet das Wundexsudat sicher auch unter Kompression. Falls erforderlich, kann der Verband zurechtgeschnitten werden.

Beoogd gebruik

Cutimed® Siltec® is bedoeld voor de behandeling van open wonden met weinig tot veel exsudaatniveaus, zoals veneuze en arteriële ulcera, drukulcera, diabetische voetulcera, chirurgische incisies, huidtransplantaties en donorsites, letsels of schaafwonden.
Cutimed® Siltec® kan helpen bij het voorkomen van drukulcera als onderdeel van een uitgebreid ondersteuningsplan, risicobeoordeling en preventieve zorg door een gezondheidszorginstelling en zorgverleners.

Neem contact op met uw zorgverleiner als u niet zeker weet of het product geschikt is voor u.

Contra-indicaties

Er zijn geen contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Cutimed® Siltec® is verpakt voor eenmalig gebruik. Niet opnieuw gebruiken of steriliseren omdat er een risico bestaat dat lichaamsvloeistoffen of verontreinigd weefsel worden overgedragen tussen patiënten. Niet gebruiken als de verpakking al open of beschadigd is. De steriliteit van het hulpmiddel is alleen gegarandeerd wanneer de verpakking voor gebruik ongeopend en onbeschadigd is. Geopende of ongebruikte materialen weggooien. Niet gebruiken met oxiderende oplossingen zoals hypochlorietet of waterstofperoxide. Verwijder het verband voorafgaand aan radiotherapie. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
De wond moet worden geïnspecteerd op tekenen van infectie en moet, indien nodig, worden behandeld volgens de klinische praktijk. In zeldzame gevallen kunnen huidreacties (bijv. roodheid, jeuk) optreden.
Raadpleeg een arts of de bevoegde zorgverleiner als de behandelde aandoening verslechtert, niet verbetert of als een bijwerking wordt waargenomen.

Aanwijzingen voor gebruik

1. Maak de wond en uw handen volgens correct klinisch gebruik schoon. Als u niet zeker weet hoe u de wond op de juiste wijze moet schoonmaken, neemt u contact op met uw zorgverleiner voor verdere instructies.
2. Zorg ervoor dat de huid omliggende droog is.
3. Kies de juiste maat verband die de wond bedekt en de wondranden overlapt (A).
4. Controleer of de verpakking niet is geopend of beschadigd. Open de verpakking en haal het wegkomt eruit.
5. Verwijder beschermingsfilm (B) en breng het verband aan met de kleefzijde naar de wond gericht (C).
6. Het verband niet oprekken.
7. Breng extra fixeerwerk verband aan.
8. Cutimed® Siltec® kan onder medisch toezicht op een geïnfecteerde wond worden gebruikt naast antimicrobiële behandelingen.
9. Indien nodig kan Cutimed® Siltec® worden gebruikt in combinatie met andere verbanden, zoals Cutimed® Sorbact®/Sorbact® (bij geïnfecteerde wonden) of hydrogel Cutimed® Gel (voor droge necrotische wonden).
10. Cutimed® Siltec® kan tot ongeveer zeven dagen op de wond blijven zitten, afhankelijk van de wondcondities en de mate van verzadiging van het wondverband. Het wordt aanbevolen het verband in het begin elke 24 uur te vervangen, later kan deze frequentie verlengd worden naar behoefte.
11. Verwijder Cutimed® Siltec® voorzichtig van de wond.
12. Indien nodig reinigt u de wond voordat u een nieuw verband aanbrengt.

Opslag en afvoer

Bewaar het verband bij kamertemperatuur, buiten direct zonlicht en beschermd tegen hoge luchtvochtigheid.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Gooi het gebruikte product weg volgens de plaatselijke voorschriften, bijvoorbeeld bij het reguliere huishoudelijk of klinische afval.

Opmerking

Alle ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan met betrekking tot dit hulpmiddel moeten worden gemeld aan BSN medical GmbH en de bevoegde autoriteit van uw land.

Gebruiksaanwijzing (SV)

Cutimed® Siltec®

Silikonskumförband med superabsorbenter

Produktbeskrivning

Cutimed® Siltec® förband är ett sortiment av skumförband med ett ytskikt av silikon.
Cutimed® Siltec® är ett sterilt, absorberande polyuretanskumförband för atraumatiska förbandsbyten, som innehåller superabsorberande remsor som sugar upp och håller kvar sårvätska.
Det invändiga kontaktskiktet bestående av perforerad silikon ska vara tillräckligt vidhäftande till den omgivande huden, men inte till den fuktiga sårbädden eller nybildad epitelvävnad. Detta minskar både traumat och smärtan vid byte av förband. Den yttre filmen är vattenavstötande, men släpper igenom luft och ånga. Skumförbandet och de superabsorberande remsorna är utformade för att absorbera och att avlägsna överflödig sårvätska i förbandet, hålla en fuktig sårmiljö och minimera risken för uppblötning. Cutimed® Siltec® är mycket följsam och skyddar såret. Cutimed® Siltec® lämnar inga rester i såret. Förbandet binder sårvätska av sår som kompenseras. Vid behov kan förbandet klippas till rätt storlek.

Avsedd användning

Cutimed® Siltec® är avsedd för behandling av sår med lågt till högt exsudatnivåer, som venösa och arteriella sår, trycksår, diabetesfotsår, kirurgiska snitt, hudtransplantat och donorställen samt skåror och skrubbsår.
Cutimed® Siltec® kan hjälpa till att förebygga trycksår som en del av en heltäckande plan för kontinuerlig vård, riskbedömning och förebyggande vård gjord av en sjukvårdsinrättning och sjukvårdspersonal.

Kontakta din läkare om du inte är säker på om produkten är lämplig för dig.

Kontraindikationer

Det finns inga kända kontraindikationer.

Varningar och försiktighetsåtgärder

Cutimed® Siltec® levereras i engångsförpackning. För ej återanvändas eller återsterilisera om effekten och finns risk för överföring av kroppsvätskor eller kontaminerad vävnad mellan patienter. Använd inte om pilaren har öppnats eller skadats eftersom produktens sterilitet endast garanteras när pilaren är oskadad och oanvänd innan. Kasseras öppet eller oanvänt material. Får ej användas med oxiderande lösningar som hypoklorit eller väteperoxid. Ta bort förbandet före strålbehandling. Endast för utvärtes bruk.
Såret ska undersökas avseende tecken på infektion och behandlas i enlighet med kliniskt praxis vid behov. I sällsynta fall kan hudreaktioner (t.ex. rodnad eller klåda) förekomma.
Om det behandlade sårets tillstånd försämras eller inte förbättras eller om en biverkning observeras, kontaktas läkare eller lämplig vårdpersonal.

Bruksanvisning

1. Rengör såret och dina händer enligt god kliniskt praxis. Om du är osäker på hur man rengör såret på lämpligt sätt ska du kontakta sjukvårdspersonal för ytterligare anvisningar.
2. Se till att den omgivande huden är torr.
3. Välj en lämplig förbandsstorlek som täcker såret och överlappar sårkanterna (A).
4. Se till att pilaren inte är öppen eller skadad. Öppna pilaren och ta ut förbandet.
5. Ta bort skyddsfilmen (B) och fäst med den vidhäftande sidan mot såret (C).
6. Undvik att sträcka förbandet.
7. Fixera förbandet ytterligare.
8. Cutimed® Siltec® kan användas på ett infekterat sår utöver antimikrobiell behandling under medicinsk övervakning.
9. Om det behövs kan Cutimed® Siltec® kombineras med andra förband, t.ex. Cutimed® Sorbact®/Sorbact® (för infekterade sår) eller hydrogel, t.ex. Cutimed® Gel (för torra, nekrotiska sår).
10. Cutimed® Siltec® kan vara kvar på plats i upp till sju dagar, beroende på sårtillståndet och förbandets vätskemättnad. Vi rekommenderar att förbandet byts en gång om dygnet i början och därefter mindre ofta efter behov.
11. Ta försiktigt bort eventuell extra fixeradbindning och avlägsna försiktigt Cutimed® Siltec® från såret och släng förbandet.
12. Vid behov kan du rengöra såret innan du sätter på ett nytt förband.

Förvaring och bortskaffning

Förvara förbandet i rumstemperatur och normal luftfuktighet, skyddat mot direkt solljus.
Produkten ska förvaras utom räckhåll för barn.
Kasserar den använda produkten i enlighet med lokala föreskrifter, till exempel i vanligt hushållsavfall eller som klinisk avfall.

Obs

Alla allvarliga incidenter som uppstår i samband med den här produkten ska rapporteras till BSN medical GmbH och till behörig myndighet i ditt land.

Käyttöohjeet FI

Cutimed® Siltec®

Erittäin imukykyinen silikonivaahtosidos

Tuotekuvaus

Cutimed® Siltec® -siteliuset ovat silikonielektrodeista koostuvaa tuotesarja. Cutimed® Siltec® on steriili, ottrasuprattelen, kertakäyttöinen, imukykyinen polyuretaanivaahtosidos.
Haavakontaktipinta on rei'itetty silikonielektrodeilla, joka kiinnittyy helposti haavaa ympäröivään ihoon mutta ei kosteaan haavapohjaan tai muodostuneeseen uuteen epiteelikerokseen. Tämä auttaa minimoimaan kudoksen vaurioitumisen ja minimoi kivun siitoksia vaihdettaessa. Pintaleikko on vettäpitävä, mutta se päästöistä ympäristöä haavaan ja bakteeri. Muotoilunvaraisine ja superabsorbentilipuvat on suunniteltu imemään ylimääränen haavaerite ja pitämään sen haavassa sisällä. Nän vähäpitäisiä kosteaa haavaympäristöä ja vähennetään maceration (kudosten pehmeneminen) riskiä. Cutimed® Siltec® muotoutuu hyvin ja suojaa haavaa. Cutimed® Siltec® -sidoksella ei jää jäämiä haavaan. Haavaerite pysyy sidoksen sisällä mykä kompressiosidosten alla käytettävissä. Siteen voidaan tarvittaessa leikata sopivan kokoiseksi.

Bruksanvisning NO

Cutimed® Siltec®

Silikonskumbandasje med superabsorberende effekt

Produktbeskrivning

Cutimed® Siltec® bandasjer er et utvalg av silikonbelagte skumbandasjer. Cutimed® Siltec® er en steril, absorberende polyuretanskumbandasje til engangsbruk for atraumatiske bandasjeskifte, som inneholder silikonelektroder som danner et gitter som er fastsittende på huden, men ikke på det tørre sårleie eller nydannet vev. Dette minimerer skade og smerte ved bandasjeskifte. Filterfilmen er vannavstøtende, men slipper gjennom luft og damp. Bandasjematerialet med de høyabsorberende partiklene trekker til seg og holder på sårvæsken. Dermed opprettholdes et fuktig sårmiljø og risikoen for maceration minimeres. Cutimed® Siltec® er meget elastisk og beskytter sårområdet godt. Cutimed® Siltec® etterlater ingen bandasjerester i såret. Bandasjen holder sikkert på sårområdet, også under kompresjonsbandasjer. Om nødvendig kan bandasjen kutter til rett størrelse.

Brugsvejledning DA

Cutimed® Siltec®

Silikone-skumforbinding med superabsorbanter

Produktbeskrivelse

Cutimed® Siltec®-forbindinger er et sortiment af silikonebelagte skumforbindinger.
Cutimed® Siltec® er en steril, atraumatisk, absorberende bandage af engangsbrug til engangsbrug med atraumatiske bandageskift, som indeholder superabsorberende strifter, der absorberer og binder sårvæsksudvi. Sårkontaktlaget består af et perforeret silikonelag, der kæber tætt til sårens greebevæv, men ikke til selve såret eller det nydannede epitelvæv. På den måde minimeres traumer og smerte ved bandageskifte. Det perforerede forbindingslag er vandavstødende, men gennemtrængeligt for ilt og vandtæt. Superabsorberingen og de superabsorberende strifter er designet til at absorbere og binde overskydende sårvæske inden i forbindingen, hvilket hvorover et fugtigt sårmiljø og minimerer risikoen for maceration. Cutimed® Siltec® tilpasser sig kroppens konturer og beskytter sårområdet godt. Cutimed® Siltec® efterlader ingen rester i såret. Selv under kompression bindes sårvæsken på en sikker måde. Forbindingen kan om nødvendigt klippes til, så størrelsen passer.

Návod k použití CZ

Cutimed® Siltec®

Silikonové pěnové krytí se superabsorbenty

Popis produktu

Krytí Cutimed® Siltec® jsou soupravou silikonem potažených pěnových krytí. Krytí Cutimed® Siltec® je sterilní, netoxické, absorpční, jednorázové, pěnové krytí s polyuretanovou pěnou, které obsahuje superabsorbentní částice, jež absorbují a fixují sekrét z rány.
Kontaktní povrch na rane bude perforovaná silikonová vrstva. Mezi ovrstvením a ranou tak nedochází k přilnutí k ráně, ale k přilnutí k tkáni vytvořené granulační tkáni. Tím minimalizuje trauma a bolest při převazech. Vnější film je vodoodolný, ale propouští propustný pro kyslík a páry.
Přírodní krytí s superabsorbentem pružně sou nanesen tak, aby absorbovaly a zachytaly přebytečnou tekutinu z rány uvnitř krytí, podporovali vlhké prostředí rány a na minimalizaci rizika macerace.
Krytí Cutimed® Siltec® se snadno přizpůsobí a zachytuje ochranu v místě rány.
Krytí Cutimed® Siltec® neponechává v ráně žádné zbytky.
Krytí se dá bez obtíží ustřihnout v míře, a to i při upevnení. V případě potřeby lze krytí upravit tak, aby bylo vhodné pro příslušnou velikost.

Käyttötarkoitus

Cutimed® Siltec® on tarkoitettu vähän tai runsaasti erittävien haavojen hoitoon, jotka ovat esim. laskimo- ja valtimopotilaat haavat, painehaavat, diabeetiset jalkahaavat, leikkaushaavat, ihosiirteet ja ihtiekset ulkoihotut, nuorrut tai hiertymät.
Cutimed® Siltec® voi auttaa paineihavojen ehkäisyssä osana kattavaa jatkuvan hoidon, riskianvaliman ja ennaltaehkäisevän hoidon suunnitelmaa terveydenhoitohenkilöstössä ja terveydenhuoltohenkilöstön parissa.

Ota yhteyttä terveydenhuolon ammattilaiseen, jos et ole varma, sopiiko tuote sinulle.

Použití

Krytí Cutimed® Siltec® je určeno k léčbě onemocnění žil a mikrožil ve vysokém rizikovém riskovému rizikovému ohrožení, jako jsou například žilní vředy, diabetické vředy, vředy diabetické nohy, chronické rany, hojení ulcerací a ran na dolních končetinách, pooperační rány, hojení ulcerací a ran na transplantátech a transplantátech, popřípadě jako ochrana proti vzniku tlakových vředů v rámci komplexní péče o pacienta.
Krytí Cutimed® Siltec® může pomoci v prevenci dekubitů jako součást komplexního plánu kontinuální péče, hodnocení rizik a preventivní péče ze strany zdravotnického personálu a zdravotnického personálu.
Pokud si nejste jistí, zda je pro vás tento prvek vhodný, obraťte se na zdravotnického pracovníka.

Kontraindikacje

Nie ma znanych żadnych kontraindikacji.

Upozornění a opatření při používání

Krytí Cutimed® Siltec® je určeno k jednorázovému použití. Nepoužívejte ho vícekrát po sterilizaci, protože vysoké teploty mohou poškodit krytí a zvyšovat riziko infekce nebo kontaminace. Nikdy nepoužívejte poškozené krytí.
Nepoužívejte, pokud je vnitřní sterilní obal porušený, protože ztratila sterilitu a zvyšuje se riziko infekce. Je-li vnější obal poškozen, nedotýkejte se sterilní oblasti.
Nepoužívejte v kombinaci s jinými výrobky, jejich kompatibilita nebyla prokázána.
Nepoužívejte v radiofrekvenčním prostředí, jako je například magnetická rezonance, protože to může ovlivnit jeho výkon.
Nepoužívejte v radiofrekvenčním prostředí, jako je například magnetická rezonance, protože to může ovlivnit jeho výkon.
Nepoužívejte v kombinaci s jinými výrobky, jejich kompatibilita nebyla prokázána.
Nepoužívejte v radiofrekvenčním prostředí, jako je například magnetická rezonance, protože to může ovlivnit jeho výkon